## Le mie prime VISITE OCULISTICHE

Progetto screening Ambliopia





IL PERCORSO CONSIGLIATO dal Servizio di Oculistica



## ALLA NASCITA IL PEDIATRA ESEGUE IL RIFLESSO ROSSO

Tutti i lattanti e bambini con riflesso di Bruckner anormale o riflesso rosso assente debbono essere inviati urgentemente a un oculista.



## **SCREENING AMBLIOPIA A 3 ANNI**

Ambliopia - Occhio Pigro (2%-4%).

Visione ridotta in genere in un occhio solo, particolarmente frequente in età pediatrica. Il recupero totale o parziale avviene attraverso un tempestivo trattamento oculistico.

Diverse tipologie di ambliopia:

- · ambliopia strabica;
- ambliopia anisometropica (difetto refrattivo differente tra i due occhi);
- ambliopia da deprivazione sensoriale (cataratta, ptosi, alterazioni vitreali).



## **VISITA OCULISTICA COMPLETA A 6 ANNI**

Valutazione dell'acuità visiva con riconoscimento di simboli E Test: il bimbo ha il compito di indicare <u>la direzione delle gambette della E</u>.



E' consigliabile anticipare la visita Oculistica quando il bambino:

- strizza gli occhi;
- inclina o ruota la testa;
- in presenza di fotofobia, sfregamento frequente degli occhi, arrossamento, lacrimazione;
- comparsa di strabismo.